

Ежегодно на территории
Беларуси регистрируется до
15 случаев малярии,
завезенной из эндемичных
регионов.

Осторожно, МАЛЯРИЯ!



ГУ «Лепельский районный центр
гигиены и эпидемиологии»

г. Лепель, ул. Войкова, 69а
Автор: Довнар А.В.

Тираж 200 экз.

Что нужно знать о Малярии!

МАЛЯРИЯ - опасное инфекционно-лихорадочное заболевание, вызываемое малярийными плазмодиями передающееся человеку в основном комарами вида «Anopheles», источником инфекции является больной или паразитоноситель, т.е. человек, в крови которого имеются малярийные паразиты. Возбудители передаются здоровому человеку от больного через укус комара.

Сравнение двух видов комаров



Малярийный комар

Комар-пискун

Причины

Заболевание вызывается одним из четырех видов малярийных паразитов, которые называются плазмодиями. Плазмодий попадает в кровяное русло при укусе инфицированного комара. Известно, что комары рода Anopheles активны обычно в ночное время.

Профилактика малярии

Избегайте поездок в малярийные районы. Если Вы все же отправились в район эпидемии, расспросите врача или фармацевта о возможных методах профилактики. Существуют специальные противомаларийные препараты. Курс начинают за 1-2 недели до поездки, продолжают прием в течении всего пребывания в зоне эпидемии и еще четырех недель по возвращении. Кроме того необходимо защитить себя от укусов комаров. Для этого используйте репелленты и москитные сетки.

Симптомы малярии

Заболевание течет циклически. Приступ малярии длится обычно 6-10 часов и проявляется резким повышением температуры до высоких цифр и последовательной сменой периодов озноба с дрожью, жара и пота. Окончание приступа характеризуется снижением температуры до нормальных и субфебрильных цифр и усиленным потоотделением продолжающимся 2-5 ч. Затем наступает глубокий сон. Приступ обычно сопровождается головной и мышечной болью, усталостью, слабостью, тошнотой и рвотой. В некоторых случаях может быть желтуха, кома. Цикл повторяется каждые 48 или 72 часа.

При возникновении подобных симптомов рекомендуется как можно скорее обратиться к врачу. При подтверждении диагноза необходима госпитализация.