

Как защититься от кори?

**КОРЬ ЯВЛЯЕТСЯ ИНФЕКЦИЕЙ,
КОТОРАЯ УПРАВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВАМИ
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ!**

За период с 2000 по 2013 год противокорьева вакцинация в мире привела к снижению смертности от кори на 75% и предотвратила 15,6 миллионов случаев смерти, сделав вакцину от этой инфекции одним из наиболее выгодных достижений общественного здравоохранения.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок Республики Беларусь:

- вакцинация против кори проводится **детям в возрасте 12 месяцев;**
- ревакцинация – **в 6-летнем возрасте.**

ЕСЛИ ЗАБОЛЕВАЕТ КОРЬЮ МАЛЕНЬКИЙ РЕБЕНОК, особенно ослабленный предшествующими заболеваниями или имеющий врожденную патологию, возможен смертельный исход.

КОРЬ ОПАСНА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ. При заражении беременной женщины корью на ранних сроках беременности, в 20% случаях происходит самопроизвольный аборт или возникают пороки развития плода.

***Переболевшие корью
сохраняют стойкий
иммунитет на всю жизнь.***

Взрослые прививаются бесплатно по эпидемическим показаниям при наличии вероятного контакта с заболевшим корью. Все остальные взрослые, не болевшие корью, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках, могут получить прививку против кори на платной основе.

Государственное учреждение
«Лепельский районный центр
гигиены и эпидемиологии»

Авторы: Михно В.А.
Довнар А.В

г. Лепель, ул. Войкова, 69а
Тираж 200 экз.

Государственное учреждение
«Лепельский районный центр
гигиены и эпидемиологии»

ОСТОРОЖНО!



КОРЬ



Февраль, 2019

Корь – острое вирусное инфекционное заболевание, которое проявляется высокой температурой тела (39°C и выше), общим тяжёлым состоянием, воспалением полости рта, верхних дыхательных путей, слизистой оболочки глаз и кожной сыпью.

По данным ВОЗ в странах Европейского региона продолжается, начавшаяся в 2016 году вспышка кори: на территории стран ЕС в 2018 году зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболеваний корью, включая 35 летальных. Наиболее крупная вспышка наблюдается в соседней Украине, где в 2018 году корью переболело более 54 тысяч человек, в том числе 16 закончились летальным исходом. За начало 2019 года зарегистрировано 2 000 случаев, включая 1 летальный.



Корь **передается** воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре).

Корь - одно из наиболее заразных инфекционных заболеваний! Если не болевший корью или не привитый человек общается с больным, то вероятность заражения **приближается к 100%**.

Источником инфекции является больной человек, причём заразный период начинается с конца инкубационного периода (от заражения до появления признаков проявления заболевания) и продолжается до 4-х дней после появления сыпи.

Как проявляется корь?

Впервые 3-6 дней заболевания протекает как ОРВИ и начинается с резкого повышения температуры тела до 38-39°C и более. Появляются насморк, чихание, покраснения глаз, слезотечение, светобоязнь, сухой и грубый «лающий» кашель, который сопровождается осиплостью голоса. На второй день на щеках появляются



белесые пятнашки с красной каймой - характерный симптом кори.

Через 3-4 дня на фоне усиления всех симптомов бо-

лезни появляется сыпь пятнисто-папулезная, очень крупная, ярко-красная, сначала на лице, за ушами, на волосистой части головы, потом на шее и верхней части груди, на туловище, руках и ногах. Иногда в период высыпания происходит новый скачок температуры. Во время лихорадки ребенок обязательно должен лежать в постели и много пить.



Обратное развитие элементов сыпи начинается с 4-го дня высыпаний: температура нормализуется, сыпь темнеет, буреет, пигментируется, шелушится (в той же последовательности, что и высыпания). Пигментация сохраняется 1-1,5 недели.

Помните



Инкубационный период (время от заражения до появления клинических признаков болезни) при кори составляет от 9 до 21 дня, поэтому болезнь может проявляться по прибытии домой. Если в течении 3 недель после прибытия из-за границы у Вас появляются признаки инфекционного заболевания, необходимо сообщить врачу, в какой стране и когда Вы там находились.

