

Меры профилактики и защиты:




Специфических способов защиты от ВИЧ-инфекции в настоящее время в мире не существует. Поэтому защита от этой страшной болезни зависит от образа жизни и поведения самого человека.

- Главным условием предупреждения заражения является нравственная чистота и верность избранному спутнику жизни.
- Всегда и син всегда пользоваться только личными предметами гигиены (зубные щетки, бритвы, ножницы).
- Требовать применения стерильного инструмента при обслуживании в различных учреждениях и организациях.
- Избегать случайных половых связей, при их возникновении пользоваться презервативом.
- Не иметь половых связей с людьми, употребляющими наркотики.
- Никогда не употреблять наркотические вещества.

Государственное учреждение «Лепельский районный центр гигиены и эпидемиологии»

К сожалению, человечеству, вероятно, не скоро удастся избавиться от ВИЧ-инфекции. Поэтому советуем вам не прекращать бесед с ребёнком о ней.



ВИЧ/СПИД,




Пусть для вас и вашего ребёнка не будет запретных тем для разговора. И не читайте подростку нотации! Тогда он с большой охотой будет обращаться к вам за советом при возникновении каких-либо проблем.

ЧТОБЫ



ЖИТЬ



Государственное учреждение
«Лепельский районный ЦГиЭ»
г. Лепель, ул. Войкова, 69а

Текст: Кунчевская О.П.
Редактор: Хотько М.А.
Оформление: Кунчевская О.П.
Тираж 200 экз.

Ноябрь, 2022

Уважаемые родители!

СПИД – чума 21 века, лекарство от которого
ещё не изобрели.

Почему вы должны говорить о СПИДЕ со своим
ребёнком?

Потому что детям всех возрастов необходимо
всё знать об этой страшной болезни.

Дети съшат о СПИДЕ с экрана телевизора, в
школе и от друзей во дворе. Многое может и не
соответствовать истине.

У детей возникает много вопросов и тревог
относительно СПИДа. Кто лучше родителей
сможет на них ответить?

Получение ребёнком информации о СПИДЕ
должно быть систематическим.

Лучший способ научить вашего ребёнка тому,
как защититься от СПИДа, состоит в том, чтобы
говорить о нем в неформальной обстановке.
Много раз повторяя, поскольку ваш ребёнок
растет, и у него могут появляться все новые и
новые вопросы.

Что надо знать о СПИДЕ?

СПИД – синдром приобретенного
иммунодефицита, смертельно опасная болезнь.
СПИД вызывается вирусом, называемым ВИЧ
(вирус иммунодефицита человека).

Приобретенного – заболевание приобретается в
течении жизни.

Иммунного – недостаточная активность
иммунной системы, ее расстройство, ослабление,
угасание защитных, иммунных сил организма в
противостоянии возбудителем болезней.
Дефицита – отсутствие отвестной реакции со
стороны иммунной системы на появление
патогенных микроорганизмов.

Развиваются поражения слизистых оболочек,
лимфоузлов, дыхательной системы, желудочно-
кишечного тракта, органов зрения, нервной
системы. Больной теряет в весе около 10%.

Протекание болезни.

Первая стадия – острая инфекция.

Протекает как «гриппоподобное» заболевание» (повышение температуры, насморк, кашель, сырь на коже). Спустя 2-3 недели острый период проходит. Следует отметить, что в 60-70% случаев острое начало может отсутствовать.

Человек, не зная о наличии вируса, может заражать других.

Вторая стадия – асимптомная инфекция (АИ).
Полное отсутствие клинических проявлений ВИЧ-инфекции. Носятелеи ВИЧ-инфекции можно выявить, проводя цитоспециальные лабораторные исследования.

Третья стадия – персистирующая генерализованная лимфаденопатия (ПГЛ). Возникает через 3-5 лет после второй стадии. На фоне снижения защитных сил организма возникают различные симптомы болезни: увеличение лимфатических узлов, головные боли, расстройство кишечника, упадок сил. Лечение дает кратковременное улучшение, человек еще трудоспособен.

Четвертая стадия – пре-СПИД и собственно СПИД. По мере развития инфекционного процесса иммунная система полностью разрушается. Организм не в состоянии бороться не только с патогенными, но и с обычными микробами.

- при дружеских поцелуях;
- при рукопожатиях;
- при кашле, чихании,
- через посуду, одежду, белье;
- при посещении бассейна, сауны, туалета;
- при укусах насекомых.

Достоверно известны три пути заражения:

- половой (при половом контакте с ВИЧ-инфицированным);
- через кровь (при переливании крови и ее препаратов и использование нестерильных игл и шприцев, при внутривенном введении наркотиков);
- от матери к ребёнку (во время беременности, родов, кормления грудью).



ВИЧ не передается:

-
-
-
-
-
-